

Модификация массивов на подмножестве индексов

Пусть задан массив $\mathbf{a} = \{a_i\}$ длины n . Назовем подмножеством массива часть из его элементов, стоящих на позициях (индексах), задаваемых некоторым условием или явно указанных в отдельном массиве индексов. Примерами подмножеств могут служить множество элементов, имеющих четные индексы, множество элементов, которые делятся на указанное число, множество элементов, образующих возрастающие участки, множество элементов, индексы которых указаны в дополнительном массиве ind длины $k \leq n$ и т.п.

Ставится задача обработки или модификации указанного подмножества данного массива. При этом предполагается, что элементы массива, не входящие в данное подмножество, не меняются, а их взаимное расположение сохраняется при любых модификациях подмножества. В частности, если при обработке подмножества требуется добавление или удаление элементов, то элементы, не входящие в подмножество, могут сдвигаться, но ни в коем случае не переставляться друг относительно друга.

Варианты действия:

- Переставить элементы указанного множества по некоторому правилу (например, отсортировать), а элементы, не входящие в него, оставить на их прежних позициях
- Исключить из подмножества некоторые элементы, при этом элементы не из подмножества могут сдвигаться, чтобы устранить образовавшиеся "дыры"
- Добавить в подмножество новые элементы, при этом добавление предполагается только "рядом" с уже имеющимися элементами подмножества, а элементы не из подмножества сдвигаются, чтобы предоставить необходимое место в массиве
- Изменить некоторые элементы подмножества.

Практически во всех подобных задачах сначала требуется создать массив индексов модифицируемых элементов. В дальнейшем будет использоваться цикл по элементам с индексами из созданного массива индексов.

Для двумерного массива в рассмотренной задаче в качестве элемента рассматривается строка или столбец массива.

Например, в двумерном массиве можно выделить столбцы, состоящие из положительных чисел, и далее требуется переставить столбцы с данными индексами так, чтобы они образовывали возрастающую по сумме чисел в столбце последовательность. При этом остальные столбцы должны остаться на своих местах.

Задачи с матрицами.

1. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых есть хотя бы один элемент, который при делении на M дает остаток N . Если в этом подмножестве есть группы столбцов с последовательно идущими номерами, то в каждой такой группе оставить только первый и последний столбцы, а "промежуточные" столбцы из матрицы удалить. Столбцы

матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

2. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы принадлежат диапазону $[M, N]$. Если в этом подмноестве есть группы одинаковых столбцов с последовательно идущими номерами, то в каждой такой группе оставить только один столбец, а остальные “копии” из матрицы удалить. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

3. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы при делении на M дают остаток N . Если в этом подмноестве есть группы одинаковых столбцов с последовательно идущими номерами, то удалить такую группу столбцов из матрицы, если количество столбцов в ней делится на N . Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

4. Дана матрица целых чисел и натуральное число M . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы больше M . Если в этом подмноестве есть группы столбцов, “упорядоченных по возрастанию”, то в каждой такой группе оставить только первый и последний столбцы, а остальные “промежуточные” столбцы из матрицы удалить. Упорядоченность понимается в смысле покомпонентного сравнения всех элементов столбцов, т.е. j -й столбец не превосходит $(j+1)$ -го столбца, если $a(i, j) \leq a(i, j+1)$ для всех i . Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

5. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых у всех элементов M -тый бит равен 0. Если в этом подмноестве есть группы из более, чем N столбцов с последовательно идущими номерами, то оставить в ней только первые N столбцов, а остальные столбцы из этой группы удалить. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

6. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы при делении на M дают остаток N . Упорядочить по возрастанию столбцы матрицы в рамках данного подмноества, считая, что сравнение столбцов соответствует сравнению сумм их элементов. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свое местоположение в матрице.

7. Дана матрица целых чисел и целое число M . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все четные элементы больше M . Упорядочить по возрастанию столбцы матрицы в рамках данного подмноества, считая, что сравнение столбцов соответствует сравнению сумм модулей их отрицательных элементов. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свое местоположение в матрице.

8. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все четные элементы при делении на M дают остаток N . Разобьем столбцы этого подмноества на пары по их последовательному порядку в подмноестве (последний столбец может не иметь пары, если их нечетное число). В каждой паре заменим элементы первого столбца на минимум из него самого и элемента второго столбца с тем же i . Второй столбец каждой пары удалить из матрицы. Если последний столбец подмноества не имеет пары, то он не обрабатывается и

сохраняется как есть. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

9. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых положительные все элементы делятся на M . Разобьем столбцы этого подмножества на пары по их последовательному порядку в подмножестве (последний столбец может не иметь пары, если их нечетное число). Каждую пару столбцов заменим на один столбец, элементы которого $a(i,j)$ есть сумма количества единиц в битовом представлении элементов с одним индексом i в этой паре. Если последний столбец подмножества не имеет пары, то он не обрабатывается и сохраняется как есть. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

10. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все нечетные элементы при делении на M дают остаток N . Упорядочить по возрастанию столбцы матрицы в рамках данного подмножества, считая, что сравнение столбцов соответствует сравнению их максимальных элементов. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свое местоположение в матрице.

11. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы при делении на M дают остаток N . Упорядочить по возрастанию столбцы матрицы в рамках данного подмножества, считая, что сравнение столбцов соответствует сравнению их максимальных элементов. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свое местоположение в матрице.

12. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых есть хотя бы один элемент, который при делении на M дает остаток N . Упорядочить по возрастанию столбцы матрицы в рамках данного подмножества, считая, что сравнение столбцов соответствует сравнению сумм их элементов. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свое местоположение в матрице.

13. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых есть хотя бы один элемент, который при делении на M дает остаток N . Упорядочить по убыванию столбцы матрицы в рамках данного подмножества, считая, что сравнение столбцов соответствует сравнению их минимальных элементов. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свое местоположение в матрице.

14. Дана матрица целых чисел и целое число M . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы больше M . Упорядочить по возрастанию столбцы матрицы в рамках данного подмножества, считая, что сравнение столбцов соответствует сравнению сумм модулей их отрицательных элементов. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свое местоположение в матрице.

15. Дана матрица целых чисел и натуральное число M . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых нет элементов, содержащих в двоичной записи ровно M единиц. Упорядочить по убыванию столбцы матрицы в рамках данного подмножества, считая, что сравнение столбцов соответствует сравнению общего количества единиц в двоичных записях всех элементов каждого столбца. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свое местоположение в матрице.

16. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы при делении на M дают остаток N . Разобьем столбцы этого подмножества на пары по их последовательному порядку в подмножестве (последний столбец может не иметь пары, если их нечетное число). В каждой паре заменим элементы первого столбца на минимум из него самого и элемента второго столбца с тем же i . Вторым столбец каждой пары удалить из матрицы. Если последний столбец подмножества не имеет пары, то он не обрабатывается и сохраняется как есть. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

17. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы принадлежат диапазону $[M, N]$. Разобьем столбцы этого подмножества на пары по их последовательному порядку в подмножестве (последний столбец может не иметь пары, если их нечетное число). В каждой паре заменим элементы $a(i,j)$ первого столбца на минимум из элементов второго столбца, индекс которых не превосходит i . Вторым столбец каждой пары удалить из матрицы. Если последний столбец подмножества не имеет пары, то он не обрабатывается и сохраняется как есть. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

18. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы делятся на M . Разобьем столбцы этого подмножества на пары по их последовательному порядку в подмножестве (последний столбец может не иметь пары, если их нечетное число). Каждую пару столбцов заменим на один столбец, элементы которого $a(i,j)$ есть сумма количества единиц в битовом представлении элементов с одним индексом i в этой паре. Если последний столбец подмножества не имеет пары, то он не обрабатывается и сохраняется как есть. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

19. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы делятся на M . Разобьем столбцы этого подмножества на пары по их последовательному порядку в подмножестве (последний столбец может не иметь пары, если их нечетное число). Каждую пару столбцов заменим на один столбец, элементы которого $a(i,j)$ есть максимум из двух чисел, составленных из младших N бит элементов с одним индексом i в этой паре. Если последний столбец подмножества не имеет пары, то он не обрабатывается и сохраняется как есть. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

20. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых хотя бы один элемент делит нацело M . Разобьем столбцы этого подмножества на пары по их последовательному порядку в подмножестве (последний столбец может не иметь пары, если их нечетное число). От каждой пары оставим в матрице только один столбец, а именно тот, который имеет больше элементов, делящихся на N (при равенстве оставляем первый из пары), а другой удаляем. Если последний столбец подмножества не имеет пары, то он не обрабатывается и сохраняется как есть. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

21. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы при делении на M дают остаток

N . Разобьем столбцы этого подмножества на пары по их последовательному порядку в подмножестве (последний столбец может не иметь пары, если их нечетное число). В каждой паре заменим элементы первого столбца на минимум из него самого и элемента второго столбца с тем же i . Вторым столбец каждой пары удалить из матрицы. Если последний столбец подмножества не имеет пары, то он не обрабатывается и сохраняется как есть. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

22. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы принадлежат диапазону $[M, N]$. Разобьем столбцы этого подмножества на пары по их последовательному порядку в подмножестве (последний столбец может не иметь пары, если их нечетное число). В каждой паре заменим элементы $a(i,j)$ первого столбца на минимум из элементов второго столбца, индекс которых не превосходит i . Вторым столбец каждой пары удалить из матрицы. Если последний столбец подмножества не имеет пары, то он не обрабатывается и сохраняется как есть. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

23. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы делятся на M . Разобьем столбцы этого подмножества на пары по их последовательному порядку в подмножестве (последний столбец может не иметь пары, если их нечетное число). Каждую пару столбцов заменим на один столбец, элементы которого $a(i,j)$ есть сумма количества единиц в битовом представлении элементов с одним индексом i в этой паре. Если последний столбец подмножества не имеет пары, то он не обрабатывается и сохраняется как есть. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

24. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых все элементы делятся на M . Разобьем столбцы этого подмножества на пары по их последовательному порядку в подмножестве (последний столбец может не иметь пары, если их нечетное число). Каждую пару столбцов заменим на один столбец, элементы которого $a(i,j)$ есть максимум из двух чисел, составленных из младших N бит элементов с одним индексом i в этой паре. Если последний столбец подмножества не имеет пары, то он не обрабатывается и сохраняется как есть. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.

25. Дана матрица целых чисел и два натуральных числа M и N . Рассмотрим подмножество столбцов матрицы, в которых хотя бы один элемент делит нацело M . Разобьем столбцы этого подмножества на пары по их последовательному порядку в подмножестве (последний столбец может не иметь пары, если их нечетное число). От каждой пары оставим в матрице только один столбец, а именно тот, который имеет больше элементов, делящихся на N (при равенстве оставляем первый из пары), а другой удаляем. Если последний столбец подмножества не имеет пары, то он не обрабатывается и сохраняется как есть. Столбцы матрицы, не входящие в данное подмножество, должны сохранить свой взаимный порядок.